



HET MERGELLAND
DIERENARTSENPRAKTIJK

10 Tips om koliek te voorkomen

1. Zorg dat er altijd **voldoende ruwvoer** ter beschikking is. Gras is hierbij het beste gevolgd door hooi.
2. Boots het natuurlijk eetpatroon na door het **krachtvoer in 3x/ dag** te geven. De darmen krijgen op die manier geen overload aan zure stoffen waardoor de kans op maagzweren drastisch daalt.
3. Zorg dat je paard altijd **vers, schoon drinkwater** ter beschikking heeft.
4. Ontworm je paard aan de hand van een **mestonderzoek** en ontworm indien nodig. Wissel hierbij af van product om resistentie tegen te gaan.
5. **Dagelijkse weidegang** brengt het maag-darmstelsel in beweging en bevordert de peristaltiek.
6. Gebruik **voederbakken** ipv voeren op de grond zodat het paard geen zand of overmatig stof opneemt tijdens de maaltijd. **Hang hooinetten niet te hoog van de grond** zodat de natuurlijke 'eethouding' (met het hoofd naar beneden) behouden blijft.
7. **Voorkom potstallen**, mest regelmatig de stal uit en verwijderen mest van de weide. Op deze manier doorbreekt u de levenscyclus van de wormen.
8. **Controleer hooi en stro** op natte, schimmelachtige plekken.
9. Een **regelmatige gebitscontrole** zorgt ervoor dat het gebit van uw paard optimaal blijft om te kauwen. Als uw paard pijn heeft in zijn mond, zal hij minder gaan kauwen. Hierdoor wordt er minder speeksel gevormd dat essentieel is voor een goede vertering.
10. Gebruik preventief **maag-darm supplementen** zoals psylliumvlozaad bij paarden die op een zanderige weide of paddock staan of gebruik kalmerende supplementen zoals Phytocalm bij angstige paarden tijdens transport. Stress is een veelvoorkomende oorzaak van koliek.



Veel succes met het toepassen van deze adviezen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Paardendierenarts Hilde Schilings
BE: +32 468 17 97 88
NL: +31 6 41 20 71 77